SINCE 1819

JPD®

GAIN WEIGHT

勝鯉

SHORI

高増体

善玉生菌配合 PROBIOTICS

骨格形成

BONE DEVELOP

内臓強化

PROTECT ORGANS





JPD高増体 勝鯉

下限水温 18℃


S粒 約 3 mm


M粒 約 5 mm


L粒 約 7 mm

高増体に特化

給餌開始 3月下旬～4月中旬頃
水温変化大 4月中旬～6月初旬頃 ⚠この時期病気に注意！
水温変化大 6月初旬～7月中旬頃 ⚠この時期病気に注意！
成長期 7月中旬～10月初旬頃
水温変化大 10月中旬~11月下旬頃 ⚠この時期病気に注意！
越冬期 12月下旬~2月下旬頃
低水温用飼料給餌

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

将軍 通年給餌できます


将軍のみ
下限水温 12℃


50% + 50%
将軍と富士桜を混ぜる
下限水温 12℃ OR 下限水温 16℃


メディカーブマックス
下限水温15℃


富士桜 OR 赤富士
下限水温 16℃ 下限水温 18℃


増体 勝鯉
下限水温 18℃


下限水温 12℃


色揚 赤富士
下限水温 18℃

OR


速効色揚 紅富士
下限水温 18℃


将軍と富士桜を混ぜる
下限水温 12℃ OR 下限水温 16℃


メディカーブマックス
下限水温15℃


鯉御膳 練り餌
下限水温 12℃

練り餌もオススメ


将軍のみ
下限水温 12℃



年間給餌スケジュール

※実際の給餌は、鯉の体調と水温をみながらおこなってください。

高たんぱく・高脂肪

高たんぱく･高脂肪処方の栄養価が高く､食いつきの良い高増体フードです。

健康な骨格育成

貝化石末･化石サンゴ粉末が健康な骨格形成をサポートします。

生菌配合プロバイオティクス

生きた菌トヨセリンは体内で活動を開始し､腸内での消化吸収をサポートし､フンと一緒に排泄された後は汚泥の分解をサポートして水をキレイにします。

【原材料】
魚粉･オキアミミール･小麦粉･大豆油かす･コーングルテンミール･米ぬか油かす･魚油･スクロースリン酸カルシウム･食塩･にんにく粉末･貝化石末･化石サンゴ粉末･トルラ酵母･トセヨリン･ベタイン･パラコッカス菌体末(アスタキサンチン源)･パパイヤ粉末･グリシン･アラニン･ビタミン類･ミネラル類

【保証成分】
粗たんぱく質：45.0%以上 / 粗脂肪：8.0%以上 / 粗繊維：5.0%以下 / 粗灰分：15.0%以下 / 水分：11.0%以下 / カルシウム：1.7%以上 / リン：1.2%以上

JPD®
日本動物薬品株式会社
東京都葛飾区西新小岩4丁目37番9号〒124-0025
JAPAN PET DESIGN CO.,LTD.
4-37-9 NISHISHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, TOKYO, JAPAN